



U svim bolje snabdevenim apotekama u R. Makedoniji

Apoteka VARUFARM

Ul. Železnička 23a Skopje, +389 2 3226 115

(USKORO U R. SRBIJI)

Varumin®

lek protiv raka

herbalni proizvod u obliku peroralnog rastvora

- ✓ Moćan i efikasan
- ✓ Izvanredno siguran

- Ne sadrži alkohol
- Ne sadrži šećer

Indikacije:

- Pomaže u lečenju tumora
- Poboljšava opšte stanje i otpornost organizma
- Dopunjuje standardnu terapiju nekih akutnih i hroničnih bolesti i stanja koja se karakterišu narušenim imunitetom i lošim opštim stanjem
- Može se i preventivno koristiti

Lečenje traje najmanje 4-6 nedelje
a prvi rezultati su vidljivi već posle prve nedelje

Info linija: + 389 70 259 222 i + 389 2 3215 800
Group international, Srbija,
+381 63 302397, +381 22 340 100, +381 22 340 594

www.varumin.com.mk
www.anticancer.mk

Varumin®

herbalni proizvod u obliku
peroralnog rastvora

Pakovanje sadrži:

Varumin® 1 (50ml peroralnog rastvora)

Varumin® 2 (200ml peroralnog rastvora)



Terapijske indikacije: terapija i lečenje tumora, sa i bez metastatskih promena, svih vrsta i sa najrazličitijom lokalizacijom i fazom rasta. Može se koristiti kao dodatak standardnoj terapiji nekih akutnih i hroničnih bolesti i stanja koja se karakterišu narušenim imunitetom i lošim opštim stanjem. Upotreba Varumin® se može preporučiti i pri multiploj sklerozi, kožnim bolestima, hipertenziji i ospitaciji.

Ne postoji nikakva opasnost od interakcija ukoliko se Varumin® koristi paralelno sa standarnom terapijom za maligne bolesti. Ovakva upotreba čak se i preporučuje zbog ubzavanja procesa oporavka. Varumin® se može koristiti za vreme i posle hemoterapije, radioterapije, imunoterapije i hirurških operacija tumora.

Mehanizam delovanja: Varumin® predstavlja kompleksnu mešavinu farmaceutskih, obrađenih lekovitih biljaka. Varumin® stabilizuje vitalne procese u ćelijama organizma i preko izazvanog sinergističkog delovanja koji obuhvata usporeno razmnožavanje malignih ćelija i smanjuje tumorske mase. Delovanje se odvija na nivou Goldijeveg aparata, kao i na drugim ćelijskim nivoima. Sastojci Varumina® regulišu imuni odgovor organizma, i zato je pogodan i pri terapiji drugih bolesti. Kod pacijenata je primećeno povećanje apetita i poboljšanje metabolizma, poboljšanje krvne slike kao i lakše podnošenje neželjenih efekata hemoterapije i zračenja.

Doziranje i način upotrebe: Odrasli Varumin® 1 uzimaju na početku terapije, jedan sat pre jela, sadržaj iz cele bočice jednom, 6 sati kasnije započinje se sa uzimanjem Varumin® 2, četiri puta dnevno (na svakih 6 sati) po jedna velika kašika 1 sat pre jela. Teži slučajevi i kod metastaziranih tumora na čvrstim tkivima: Varumin® 2 uzima se 6 puta dnevno (na svaka 4 sata) po jedna kašika 1 sat pre jela. Deca: Varumin® 1 uzima se dva puta dnevno u roku od 6 sati, 1 sat pre jela. 6 sati kasnije se započinje sa uzimanjem Varumin® 2, tri puta dnevno po jedna velika kašika 1 sat pre jela, ipak, za upotrebu kod dece mlađe od 10 godina, preporučuje se konsultacija sa lekarom.

Vreme trajanja terapije: Varumin® se uzima kontinuirano u periodu od najmanje 4-6 nedelje. Poboljšanje stanja pacijenta i bolji rezultati analiza su dobar pokazatelj za produžavanje terapije.

Kontraindikacije: Varumin® ne bi trebale koristiti osobe preosetljive na neku od komponenti preparata, osobe sa intestinalnom opstrukcijom, osobe sa hroničnim inflamatornom intestinalnom bolesti (Cronova bolest, ulcerativni colitis), osobe sa upalom slepog creva (appendicitis), osobe sa hipertiroidizmom, pri trudnoći i dojenju. U ovim slučajevima Varumin se može uzimati samo posle konsultacije sa lekarom.

Posebna upozorenja: Ne postoje. Varumin® ima izvanredan sigurnosni profil, ne sadrži hemijske dodatke, sastavljen je isključivo od biljnih sirovina koje nikada nisu bile izložene toksičnim preparatima.

Interakcije: Postoje nekoliko potencijalnih efekata koji se pripisuju prisustvu aloeje, ali u dugogodišnjoj upotrebi Varumin® nije primećena nikakva interakcija. Viscum album može povećati efekat kardijalnih glikozida, hipotenzivnih i hipertenzivnih lekova, antidepresiva i antikoagulanasa.

Neželjena delovanja: Dosađ nije zabeležen ni jedan neželjeni efekat kod upotrebe Varumin®. Pri dugotrajnoj upotrebi Varumin®, vrlo retko može doći do dijareje.

Pre upotrebe pročitati priloženo uputstvo.

Odobrenje za promet broj 15-3003/09, 28.10.2009. godine

Preporučujemo:

Varuascitofin čaj koji pomaže pri izbacivanju tečnosti iz trbušne šupljine (ascites)

(mogu se paralelno upotrebljavati sa terapijom Varumin®)

Sve dopunske informacije možete dobiti na našim web stranicama ili na našim telefonskim brojevima i adresama.

Proizvodilac:

IEG PHARMACEUTICAL INDUSTRY
IEG INTER-EVROGENEKS

Proizvodnja:
ul. Goce Delčev br.12
2434 Novo Selo
tel/fax: +389 34 355334
e-mail: varumin@t-home.mk
www.varumin.com.mk
www.interevrogeneks.com

Generalni zastupnik za Srbiju
„GROUP INTERNATIONAL“ d.o.o.
Stari Banovci,
Branka Radićevića 3
Mobični + 381 63 302 397
Telefon +381 22 340 100
+381 22 340 594
e-mail: office@group-international.net